

Instrucciones para la Medicación de su Cirugía

Fecha de Cirugía: ____/____/____

DERECHO

IZQUIERDO

SEMANA 1



Día de Cirugía	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Día 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Día 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Día 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Día 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Día 6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Día 7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

SEMANA 2



Día 8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Día 9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Día 10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Día 11	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Día 12	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Día 13	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Día 14	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

SEMANA 3



Día 15	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Día 16	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Día 17	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Día 18	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Día 19	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Día 20	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Día 21	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

RESTRICCIONES POSTOPERATORIAS (POR UNA SEMANA)

- No frotar el ojo
- No agua directamente en el ojo y no nadar
- Evite que el polvo, la suciedad, los desechos y el maquillaje entren en contacto con los ojos

INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS

- Su visión puede ser nublada los primeros días y mejorar gradualmente
- Los siguientes síntomas son normales las primeras semanas después de la cirugía:
 - » Sensación de picazón o dolor
 - » Enrojecimiento de los ojos
 - » Sensibilidad a la luz
- Para mayor comodidad, puede usar Tylenol o Advil de venta libre, tómelos de acuerdo con las instrucciones del frasco y su médico personal.
- Está bien seguir con sus gotas para los ojos habituales (lágrimas artificiales, medicamentos para el glaucoma, etc.)
- Está bien leer y ver televisión.

Si tiene un dolor que empeora o pérdida repentina de la visión, llámenos de inmediato al 281-800-1585.

Durante las horas de la noche y los fines de semana, será dirigido a nuestro sistema de correo de voz, marque 0 durante el aviso y será transferido al médico. Si no puede ponerse en contacto con el médico, vaya a la sala de emergencias más cercana.